

Presentación del caso

Fabián Caruso, Natalia Promizio, Diego Korol

Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Interzonal General de Agudos "Eva Perón", San Martín, Buenos Aires, Argentina

Resolución del caso en la página 519.

Traumatismo de rodilla con limitación de la movilidad

RESUMEN

Hombre de 36 años de edad, deportista, sometido a una cirugía plástica del ligamento cruzado anterior a los 20 años. Evolucionó con limitación de la movilidad de la rodilla izquierda residual, sin traumatismo previo.

Palabras clave: Rodilla; dolor.

Nivel de Evidencia: IV

Knee Trauma with Restricted Range of Motion

ABSTRACT

A 36-year-old male athlete had undergone anterior cruciate ligament reconstruction at age 20. He later developed residual restriction in the range of motion of his left knee, with no preceding trauma.

Keywords: Knee; pain.

Level of Evidence: IV

INTRODUCCIÓN

Un hombre de 36 años acudió a la consulta con limitación funcional de la rodilla izquierda a 90° y dolor, además de bloqueos esporádicos. A los 20 años, había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) durante la práctica deportiva y había sido sometido a una cirugía plástica del LCA con un injerto hueso-tendón-hueso y colocación de un tornillo biodegradable. A los tres meses, se le realizó una segunda operación por rotura del tornillo biodegradable, que fue extraído y se detectó una lesión osteocondral.

Se le solicitó una resonancia magnética (RM).

HALLAZGOS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTUDIOS POR IMÁGENES

En las imágenes de la RM ponderada por densidad protónica, se observaron artefactos de susceptibilidad magnética en relación con la plástica del LCA que tenía una señal y una morfología adecuada. Se visualizó una imagen focal redondeada proximal al neoligamento y otra imagen focal redondeada por detrás de su tercio proximal. Otros hallazgos fueron: aumento del líquido articular, rótula correctamente alineada con la tróclea femoral, cartílago sin lesiones, meniscos sin roturas, ligamento cruzado posterior íntegro con orientación normal, ligamento colateral interno respetado y ligamento colateral externo sin alteraciones ([Figura 1](#)).

Recibido el 3-7-2026. Aceptado luego de la evaluación el 7-7-2026 • Dr. FABIÁN CARUSO • Fabianpabloc@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0000-7210-2725>

Cómo citar este artículo: Caruso F, Promizio N, Korol D. Instrucción Ortopédica de Posgrado – Imágenes. Presentación del caso. *Rev Asoc Argent Ortop Traumatol* 2026;91(5):408-409. <https://doi.org/10.15417/issn.1852-7434.2026.91.5.2427>




Figura 1. Resonancia magnética de rodilla ponderada por densidad protónica, cortes sagitales. Se observan artefactos de susceptibilidad magnética en relación con la cirugía plástica del ligamento cruzado anterior (flecha roja) e imágenes circunscritas de señal hipointensa focal intrarticular (flechas blancas).

Conflicto de intereses: Los autores no declaran conflictos de intereses.

ORCID de N. Promizio: <https://orcid.org/0009-0009-4296-7395>

ORCID de D. Korol: <https://orcid.org/0009-0004-7973-1144>